

No. 0041

アカネキヒダタケ(幸徳仮称)

Phylloporus orientalis Corner var. *orientalis* ?







孢子

●傘は径 1.5-7.0cm, 平らな饅頭形のち平開;表面はビロード状, 成長すれば細かくひび割れ, はじ

めはほぼ黒色, 成長すると暗褐色～褐色～淡褐色, 傷つくとやや褐変する.

●柄は 2-4×0.5-0.8cm, 上下同径, 基部でやや細くなり, 中心性～やや偏心性, 中実;表面は淡茶色の地に暗赤色の鱗片が密に付着し, 頂部はやや黄色く, 隆起した縦筋がある.

●ヒダは疎, 垂生, 幅 0.3-1.0cm, 黄色のち汚黄色, 縁部は暗赤茶色～暗褐色で成長すると汚淡茶色, 小ヒダがあり, 全縁.

●肉は厚さ 0.2-0.7cm, 傘部で淡黄色, 柄の上～中部で淡黄色, 中～下部で帯赤ベージュ色, 切断すると速やかに青変し, 質はわりと丈夫, 特別な匂いはなく, 味はやや苦い.

●胞子紋はオリーブ色.

●胞子は類紡錘形, 大きさ 12-15×4.5-5.5 μ m (8 個測定), Q 比 2.4-3.1, 淡黄褐色～淡オリーブ色.

●2009 年 7 月 30 日に同じ採取地で採取した個体の胞子は大きさ 11.5-15.5×5-5.5 (20 個測定), Q 比 2.3-3.1.

採集日 2009 年 7 月 13 日

採集場所 神戸市須磨区

採集環境 コナラ・カシ樹下

採集者 幸徳伸也

同定者 幸徳伸也

標本番号 KS0017